


An anatomical illustration of human lungs, showing the bronchial tree and vascular network. The lungs are rendered in a glowing, semi-transparent style with a color gradient from red to yellow. The background is a dark blue silhouette of a human torso. Overlaid on the lungs is the text '武漢肺炎' in a large, bold, stylized font with a yellow-to-orange gradient and a thick black outline.

武漢肺炎

了解與防疫



疫情時間表

認識武漢肺炎

如何防疫

疫情時間表

武漢肺炎事件時間表

2019年12月1日 首位病例

2019年12月下旬 華南海鮮市場出現大量病例

2019年12月30日 武漢市衛健委證實網路謠傳的「不明原因肺炎」文件為事實

2020年1月7日 專家檢測出病毒為新型冠狀病毒

武漢肺炎事件時間表

2020年1月11日 首位死亡案例出現

2020年1月12日 世界衛生組織正式命名為「2019 新型冠狀病毒」

2020年1月19日 世界衛生組織,表明新型冠狀病毒存在有限度人傳人

2020年1月20日 中國境內累計291例,死亡6例

武漢肺炎事件時間表

2020年1月22日 台灣確診1例，美國確診1例，澳門香港各確診1例，泰國4例

2020年1月23日 台灣增加2位確診，武漢市採取封城措施



武漢封城 街道淨空

2020年1月24日 中國醫學研究中心，指出可以有效人傳人，未必出現發燒等症狀

2020年1月24日 中國境內病例達到830位，死亡人數達25位

武漢肺炎事件時間表

2020 年 1 月 25 日 美國確診 2 例，尼泊爾 1 例，香港 5 例，法國 2 例，德國 3 例，泰國 5 例

2020 年 1 月 25 日 台灣提高陸客入境限制，觀光等不準入台，陸生及配偶不受限制

2020 年 1 月 26 日 中國延長春節假期至 2/2，全國學校延遲開學

2020 年 1 月 27 日 中國發佈除了飛沫傳染之外也會有接觸傳染可能。

武漢肺炎事件時間表

2020年1月28日 台灣流行疫情指揮中心增加電子監控，超商每天供應6百萬口罩

2020年1月28日 世界衛生組織認定此肺炎為全球性高風險

2020年1月29日 中國確診人數6081位，死亡132位



武漢六天急建醫院

台灣感染肺炎病例時間表

2020年1月21日 臺灣55歲女性商人
境外移入

2020年1月24日 中國大陸50餘歲女性遊客
境外移入

2020年1月24日 臺灣50餘歲男性商人
境外移入

2020年1月26日 中國發佈除了飛沫傳染之外
也會有接觸傳染可能。

台灣感染肺炎病例時間表

2020年1月27日 臺灣中部50餘歲女性
境外移入

2020年1月28日 中國大陸70餘歲女性遊客(甲)
境外移入

2020年1月28日 中國大陸70餘歲女性遊客(乙)
境外移入

2020年1月28日 臺灣中部50餘歲男性
境內傳染



電子監控隔離者



認識武漢肺炎

武漢肺炎
了解與防疫

武漢肺炎症狀

發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。



★腹瀉、痠痛恐罹武漢肺炎



武漢肺炎症狀

進展至重症患者，除雙肺 X 光呈瀰漫性毛玻璃狀病變的病毒性肺炎表現外，會出現急性呼吸道窘迫症候群、敗血性休克、代謝性酸中毒或凝血功能障礙等，甚至死亡



★ 無症狀也有傳染力



武漢肺炎檢驗條件

- 一. 發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) 或急性呼吸道感染。
- 二. 診斷顯示有肺炎。
- 三. 曾去過中國湖北省(含武漢地區)，或曾接觸來自湖北省(含武漢地區)有發燒及呼吸道症狀人士。
- 四. 曾有中國大陸(不含港澳)之旅遊居住史。
- 五. 接觸過確診案例



◆ 新型冠狀病毒防疫篇

武漢肺炎感染源


已知會感染人類的七種冠狀病毒以外，其他的動物宿主包括蝙蝠(最大宗)、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等。並有零星的跨物種傳播報告。

大陸華南海鮮市場販賣野生動物
供人食用(目前禁止)




什麼是冠狀病毒？

2019 新型冠狀病毒，是來自此病毒，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。



武漢肺炎是甚麼病毒



傳播模式

目前對2019新型冠狀病毒的完整傳播途徑，尚未完全瞭解。目前高度懷疑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液而增加人傳人之感染風險。



接觸也可能傳染



感染這種新型冠狀病毒會死亡嗎？

嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。



治療方法

目前這個病毒感染後尚無特定有效藥物可供治療，建議依個案臨床症狀或病況，給予適當支持性醫療處置，會有成效。



武漢病毒可治療嗎



如何防疫

政府動作

自2003年SARS疫情開始，台灣就已在國際港埠針對所有的國際航班做發燒篩檢，並針對個案旅遊史進行相關檢疫評估。中央流行疫情指揮中心針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估是否符合後送就醫條件，以阻止疫情擴大到社區。

學校動作

1. 請學校預先備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需。
2. 師長主動關心學生健康狀況。
3. 加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣。
4. 環境清潔消毒。

學校動作

5. 在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校。
6. 室內維持通風。
7. 如發現疑似感染新型冠狀病毒學生，可通報當地衛生局或撥打 1922 協助轉診。

個人防疫

預防措施與其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、配戴外科口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，且避免接觸野生動物與禽類。



抗肺炎保護措施

面對中國武漢肺炎 協助防疫可以怎麼做

平時養成這些習慣

量體溫、以肥皂勤洗手
減少觸摸眼鼻口
盡量不要到人多擁擠的公共場所

若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀

務必在家休息，不要到公共場所

如有必要外出，例如：就醫

務必戴口罩、肥皂勤洗手
並妥善處理口鼻分泌物

2020/1/26

中央流行疫情指揮中心 關心您

衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

個人防疫

為防範中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，提醒民眾及陪病家屬如需出入醫療院所，請自備口罩全程佩戴，並應每天更換，若破損或弄髒則應立即更換；另一般外科口罩即可阻擋大部分病毒。

協助防疫我可以怎麼做

臺灣加油

平時應該養成

量體溫

以肥皂勤洗手

減少觸摸眼鼻口

盡量不要到人多擁擠的公共場所

若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀

務必在家休息，不要到公共場所

若有必要外出，例如，就醫

務必戴口罩

以肥皂勤洗手

妥善處理口鼻分泌物

個人防疫

有咳嗽等呼吸道症狀時應戴外科口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應將已污染之口罩內摺丟進垃圾桶，並立即更換口罩。



口罩怎麼選才對？

口罩的正確使用時機

棉布印花口罩
或紗布口罩




僅能過濾較大顆粒，可作為保暖、避免灰頭土臉與鼻孔骯髒等用途，清洗後可重複使用。

活性炭口罩



可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，**不具殺菌功能**，適合騎機車、噴漆作業、噴灑農藥等時機使用，一旦須費力呼吸或無法吸附異味時應更換。

醫用口罩
或外科口罩



一般醫療用，有呼吸道症狀、前往醫院等密閉不通風場所，或前往有呼吸道傳染病流行地區時佩戴，可阻擋大部分的5微米顆粒，應**每天更換**，但破損或弄髒應立即更換。

N95口罩



可阻擋95%以上的次微米顆粒，**適合第一線醫護人員使用**，因呼吸阻抗較高，不適合一般民衆長時間配戴，且應避免重複使用。

2020/1/27

中央流行疫情指揮中心 關心您



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

武漢肺炎

了解與防疫

個人防疫

打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻，若無面紙或手帕時，可用衣袖代替。

武漢肺炎

了解與防疫

打噴嚏時， 請用衣袖遮口鼻！

你還在用手搗口嗎？
小心！沾染病菌的雙手，可能再觸摸公車拉環、手扶梯、電梯按鈕、門把；等公共設施，會把病菌傳播給周遭的人。

其實你有更好的選擇！
打噴嚏或咳嗽時，

- ☑ 請以手帕或衛生紙遮住口、鼻
- ☑ 若來不及，請以衣袖代替，降低病菌傳播機會

【防疫大使】溫昇豪



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：☎1922 <http://www.cdc.gov.tw>

個人防疫

如有呼吸道症狀，
與他人交談時，
請戴上外科口罩
與保持良好衛生
習慣，並儘可能
保持 1 公尺以上
距離。

武漢肺炎

了解與防疫

咳嗽禮節 與 手部衛生

防範流感，請落實 咳嗽禮節與手部衛生

1 咳嗽時用衛生紙
遮住口鼻，然後將紙
丟進垃圾桶。



2 如果可以忍受，咳嗽時應戴
口罩。



3 手部接觸到呼吸道
分泌物之後務必要洗手
(使用酒精性乾洗手劑或
肥皂及清水洗手)。



4 儘可能與別人距離保持
1公尺(3英尺)以上。



手部衛生：

- 拱手取代握手
- 咳嗽用手帕掩口鼻
- 用肥皂勤洗手
- 雙手不碰觸眼口鼻

廣告



個人防疫

手部接觸到呼吸道分泌物時，要立即使用肥皂及清水搓手並澈底洗淨雙手。



抗肺炎 如何消毒

武漢肺炎

了解與防疫

正確勤洗手 保護你我他

濕洗手40~60秒

先用水沾濕雙手後，使用肥皂或洗手乳，再進行洗手七步驟：



記得擦手紙要丟到垃圾桶喔!

個人防疫

身體症狀可能出現如發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠/疲倦、部分少數患者合併出現腹瀉。

武漢肺炎

了解與防疫

若你近期曾去過武漢，
且出現身體不適狀況...

1. 請撥打防疫專線 1922，
並戴口罩儘快就醫。
2. 就醫時告知醫師武漢旅遊史、
接觸史及不適症狀等。
3. 生病在家休息不出門，
減少或避免與他人接觸。
4. 咳嗽打噴嚏時，
以紙巾或衣袖掩口鼻。
5. 有呼吸道症狀應持續戴口罩。

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

www.cdc.gov.tw

1922防疫達人
www.facebook.com/TW-CDC

Taiwan CDC
LINE@

疫情通報及諮詢專線：1922

個人防疫

在症狀開始後，除就醫外，應儘量在家中休息至症狀緩解後 24 小時以上。

患者應避免搭乘航機、船舶等交通運輸工具，以避免將病毒傳染給其他人。

若你近期曾去過武漢，
且出現身體不適狀況...

1. 請撥打防疫專線 1922，並戴口罩儘快就醫。
2. 就醫時告知醫師武漢旅遊史、接觸史及不適症狀等。
3. 生病在家休息不出門，減少或避免與他人接觸。
4. 咳嗽打噴嚏時，以紙巾或衣袖掩口鼻。
5. 有呼吸道症狀應持續戴口罩。



個人防疫

倘若您被衛生單位之公衛人員告知是嚴重特殊傳染性肺炎確診病患的接觸者時，須配合執行居家(個別)隔離規定，不外出，亦不得出境或出國。



個人防疫

若於健康監測期間有發燒或呼吸道症狀時，請立即(全程)戴上外科口罩，主動與縣市衛生局聯繫，或**請立即撥打 1922 防疫專線**或由填發「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家(個別)隔離通知書」之單位安排就醫。就診時務必主動告知旅遊史、職業暴露、有關的暴露，以及身邊是否有其他人有類似的症狀。



★ 新型冠狀病毒部長篇

罰則

中央流行疫情指揮中心表示，需自主健康管理者，若未確實遵守規定，將執行**強制隔離**，地點已經準備好。

如果未配合隔離規定，可處**6萬元到30萬元罰鍰**，若傳染他人則可處**3年刑責**。千萬不可輕看防疫措施以及自主管理。